

硫酸链霉素溶液 (Streptomycin, 10mg/ml)

产品货号: R21788

产品规格: 10ml/50ml

产品简介:

硫酸链霉素又称链霉素硫酸盐, 为一种氨基糖苷类抗生素, 临床上主要用于兔热症、鼠疫、严重布氏杆菌病和鼻疽的治疗, 也用于结核病的二线治疗。

硫酸链霉素的抑菌原理在于能与细菌核糖体 30S 亚单位结合, 抑制细菌蛋白质的合成, 特别是对结核杆菌具有强大的抗菌作用。对多数革兰阳性球菌(如链球菌)和杆菌(如铜绿假单胞菌、厌氧菌)的抗菌作用不强, 对许多革兰阴性杆菌有较强的抗菌作用, 有抑制结核杆菌繁殖及毒素产生的作用, 高浓度时(>0.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 有杀菌作用。不过, 细菌与链霉素接触后极易产生耐药性, 可以和其他抗菌药物或抗结核药物联合使用以减少或延缓耐药性的产生。

硫酸链霉素溶液 (Streptomycin, 10 mg/ml) 由高纯度硫酸链霉素和去离子水配置而成的储存液, 经无菌处理。使用时可以联合其他抗生素类药物一起加入到培养基中, 一般工作浓度为 10~50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 。本品仅用于科研, 不用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	储存条件
硫酸链霉素溶液 (Streptomycin, 10mg/ml)	10ml/50ml	-20 $^{\circ}\text{C}$, 避光

自备材料:

1. 细胞培养液
2. 超净台
3. 相关仪器耗材

操作步骤:

1. 取出 Streptomycin solution(34mg/ml)室温放置使其融化。
2. 超净台内, 按照每 100ml 无菌细胞培养液添加 100~500 μl (对应 10~50 $\mu\text{g}/\text{ml}$)的比例加入 Streptomycin solution, 混匀即可使用。亦可在配制培养液时先加入 Streptomycin solution, 然后再过滤除菌。
3. 亦可根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 避免反复冻融, 以免失效。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com